

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
имени М.В. ЛОМОНОСОВА  
Факультет Вычислительной математики и кибернетики  
Задачи по ТП для подготовки к экзамену по курсу

«Прикладная алгебра»  
(5 семестр, III поток, 2013/14 уч. год)

Задача № 1 (ТП)

Найдите порядок стабилизаторов произвольной (а) вершины, (б) ребра и (в) грани куба при действии группы октаэдра  $O$  на соответствующие элементы. Какие перестановки в них содержатся?

Решение.

- (а) Пусть  $O$  действует на вершины куба и  $v$  — некоторая вершина. Тогда  $\text{Stab}(v) \cong Z_3$  — группа вращений на  $120^\circ$  (в выбранном направлении) вокруг диагонали куба, проходящей через данную вершину (подгруппа  $O$ ) и  $|\text{Stab}(v)| = 3$ .
- (б) Пусть  $O$  действует на рёбра куба и  $e$  — некоторое ребро. Тогда  $\text{Stab}(e) \cong Z_2$  — группа вращений на  $180^\circ$  вокруг оси, проходящей через середины рёбер (данного и ему противоположного) куба (подгруппа  $O$ ) и  $|\text{Stab}(e)| = 2$ .
- (в) Пусть  $O$  действует на грани куба и  $f$  — некоторая грань. Тогда  $\text{Stab}(f) \cong Z_4$  — группа вращений на  $90^\circ$  (в выбранном направлении) вокруг оси, проходящей через середины граней (данной и ей противоположной) куба, (подгруппа  $O$ ) и  $|\text{Stab}(v)| = 4$ .

Задача № 2 (ТП)

Сколькими геометрически различными способами три абсолютно одинаковые мухи могут усесться в вершинах правильного семиугольника, нарисованного на листе бумаги?

Решение.

Множество  $T$  — вершины семиугольника, на которые действует группа  $Z_7 = \langle t \rangle$ ,  $t^7 = e$ .

Элемент $g \in Z_7$	$Type(g)$	$w(g)$
$e$	$\langle 7, 0, \dots \rangle$	$x_1^7$
$t, t^2, \dots, t^6$	$\langle 0, \dots, 1 \rangle$	$x_7$
		7

Цикловой индекс:  $P(Z_7) = \frac{1}{7} [x_1^7 + 6x_7]$ .

Число различных раскрасок в 2 цвета (муха есть/нет), при условии окраски ровно 3-х вершин из 7-и — коэффициент  $u_3$  при  $y^3$  после подстановки  $x_1 \mapsto y + 1, x_7 \mapsto y^7 + 1$  в  $P(Z_7)$ :

$$W = \frac{1}{7} [(y+1)^7 + 6(y+1)] = \frac{1}{7} \left[ \dots + \binom{7}{3} y^3 + \dots \right].$$

$$u_3 = \frac{7!}{7 \cdot 3! \cdot 4!} = \frac{5 \cdot 6}{3!} = 5.$$

### Задача № 3 (ТП)

Определить число различных раскрасок граней 4-х угольной пирамиды в 3 цвета.

### Задача № 4 (ТП)

Найти цикловой индекс группы симметрии правильного треугольника.

### Задача № 5 (ТП)

Сколько различных ожерелий можно составить из 7-ми круглых бусин двух цветов (красного и синего).

Решение.

Задача может быть переформулирована: сколькими различными способами можно раскрасить вершины правильного семиугольника в два цвета?

Группа симметрии правильного семиугольника — группа диэдра:  $D_7 = \langle t, f \rangle, t^7 = f^2 = e, |D_7| = 2 \cdot 7 = 14$ .

$$D_7 = \langle e, t, t^2, t^3, t^4, t^5, t^6, f, tf, t^2f, t^3f, t^4f, t^5f, t^6f \rangle.$$

Действует она на вершины правильного семиугольника — т.е. имеет место транзитивное самодействие.

Элемент $g \in D_7$	$Type(g)$	$w(g)$
$e$	$\langle 7, 0, \dots \rangle$	$x_1^7$
$t, t^2, \dots, t^6$	$\langle 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 \rangle$	$x_7$
$f, tf, \dots, t^6f$	$\langle 1, 3, 0, \dots \rangle$	$x_1 x_2^3$

Цикловой индекс:  $P_{D_7} = \frac{1}{14} [x_1^7 + 6x_7 + 7x_1 x_2^3]$ .

Число различных раскрасок в  $r$  цветов —  $\frac{1}{14} [r^7 + 6r + 7r^4]$ .

Для  $r = 2$  имеем  $\frac{1}{14} [2^7 + 12 + 7 \cdot 16] = \frac{128 + 12 + 112}{14} = \frac{252}{14} = 18$

### Задача № 6 (ТП)

Найти число различных вариантов раскраски вершин тетраэдра в 2 и 3 цвета.

Решение.

Группа вращений тетраэдра —  $T = \langle t, f \rangle, t^3 = f^2 = e, |T| = n = 12$ , где

$t$  — вращение на  $120^\circ$  вокруг оси, проходящей через центр грани и противоположную вершину тетраэдра,  $\langle t \rangle \cong Z_3$ , всего таких осей — 4;  
 $f$  — вращение на  $180^\circ$  вокруг оси, проходящей через середины противоположных рёбер,  $\langle f \rangle \cong Z_2$ , всего таких осей — 3.

$$T = \langle e, t, t^2, f, tf, t^2f, ft, ft^2, t^2ft, tft, tft^2 \rangle.$$

Обозначим через  $V$  множество граней тетраэдра;  $|V| = N = 4$  (в силу самодвойственности тетраэдра можно решать задачу раскраски его граней). Перенумеруем грани тетраэдра цифрами 1, 2, 3 и 4 и считаем, что ось вращения, задаваемого элементом группы  $t$  проходит через центр грани 1.

Элемент $g \in T$	$Type(g)$	$w(g)$	Кол-во
$e = (1)(2)(3)(4)$	$\langle 4, 0, 0, 0 \rangle$	$x_1^4$	1
$t = (1)(234)$	$\langle 1, 0, 1, 0 \rangle$	$x_1x_3$	8
$f = (12)(34)$	$\langle 0, 2, 0, 0 \rangle$	$x_2^2$	3
			12

Цикловой индекс:  $P(T : V) = \frac{1}{12} [x_1^4 + 8x_1x_3 + 3x_2^2]$ .

$$\#Col(2) = \frac{2^4 + 11 \cdot 2^2}{12} = \frac{16 + 44}{12} = 5. \quad \#Col(3) = \frac{3^4 + 11 \cdot 3^2}{12} = \frac{81 + 99}{12} = 15.$$

### Задача № 7 (ТП)

Найти число различных вариантов раскраски вершин куба в 2 и 3 цвета.

### Задача № 8 (ТП)

Найти цикловой индекс группы симметрии правильного  $n$ -угольника (группы диэдра)  $D_n$ .

### Задача № 9 (ТП)

Имеются плоские бусины, окрашенные с одной стороны в красный, синий и зелёный цвета. Из них составляют ожерелья, содержащие по 6 в равноотстоящих точках окружности. Определить

- число различных 2-х и 3-х цветных ожерелий;
- число цветных ожерелий с одной красной бусиной?

Решение.

Здесь везде — транзитивное самодействие циклической группы из 6 элементов.

а) Общее число ожерелий.

$$|T| = N = 6, \quad G \cong Z_6 = \langle g \rangle, \quad g^6 = e.$$

$$P(Z_6) = \frac{1}{6} \sum_{d: d|6} \varphi(d) x_d^{6/d} \quad \square \equiv$$

$$d = 1, 2, 3, 6. \quad \varphi(1) = \varphi(2) = 1, \quad \varphi(3) = \varphi(6) = 2.$$

$$\square \equiv \frac{1}{6} [x_1^6 + x_2^3 + 2x_3^2 + 2x_6] = W(x_1, \dots, x_6).$$

$$r = 2 \text{ цвета} \Rightarrow x_k = 2; \quad k = 1, 2, \dots, 6.$$

$$\#Col(2) = \frac{1}{6} [2^6 + 2^3 + 2 \cdot 2^2 + 2 \cdot 2] = \frac{84}{6} = 14.$$

$$r = 3 \text{ цвета} \Rightarrow x_k = 3;$$

$$\#Col(3) = \frac{1}{6} [3^6 + 3^3 + 2 \cdot 3^2 + 2 \cdot 3] = \frac{780}{6} = 130.$$

б) Полагаем  $y_1 = y$ ,  $y_2 = y_3 = 1$  (следим только за бусинами красного цвета, которым отвечает  $y_1$ ). Найдём коэффициент  $u_1$  при  $y_0, y_1, y_2$  в производящем многочлене  $W$  при подстановке

$$x_1 = y + 2, \quad x_2 = y^2 + 2, \quad x_3 = y^3 + 2.$$

$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{6} [(y+2)^6 + (y^2+2)^3 + 2(y^3+2)^2 + 2(y^6+2)] = \frac{1}{6} [u_0 + u_1 y + u_2 y^2 + \dots + u_6 y^6] = \\ &= \frac{1}{6} [\dots + 6 \cdot 2^5 y + \dots + u_6 y^6]. \end{aligned}$$

Число ожерелий с ровно одной красной бусиной —  $u_1 = 32$ .

### Задача № 10 (ТП)

Для раскраски сторон квадрата на стеклянной пластинке используют 3 цвета — красный, синий и зелёный. Сколько можно получить

- 1) разнораскрашенных квадратов?
- 2) квадратов с одним красным ребром и не более 2-х синих?